



Août 2018



Agenda & activités ApiSion 2018

Rencontre mensuelle au rucher école, mardi 14.08.2018 à 19h00

Nourrissement, élevage des nuclei d'été et préparation au 2ème traitement d'été.

Claude Pfefferlé

Août 2018

nourrissement

Le nourrissement d'été a pour but de permettre à la colonie de faire ses réserves pour l'hiver.

On donnera du sirop concentré pour épargner les ouvrières et leur éviter d'éliminer une trop grande quantité d'eau.



Claude Pfefferlé 2

Août 2018

nourrissement

A fin septembre, la colonie de 12 c doit pouvoir compter sur ~16 kg de réserves (env. 20 l de sirop), soit environ **4 cadres de corps**.



Il est préférable de nourrir régulièrement plutôt que donner tout le sirop en 1 fois et de bloquer la ponte par manque de place.



Claude Pfefferlé 3

Août 2018

nourrissement

Un peu de maths :

Si à mi-août, la colonie a 2 cadres de nourriture, il lui manque 2 cadres de réserves, soit ~8 kg de miel ou 8 litres de sirop concentré à donner sur 5 semaines car la semaine du 2^e traitement d'été (début septembre) est à déduire.



Claude Pfefferlé 4

Août 2018 élevage des nuclei d'été

Les abeilles des hausses ont été récupérées pour créer des nuclei d'été sur 5 cadres gaufrés.

Contrôler l'acceptation de la reine et la présence de la ponte.

Nourrir avec du sirop 50% pour stimuler la reine et les bâtisseuses.

Introduire un dernier cadre gaufré pour arriver à un total de 6 cadres.

Dès lors, sirop concentré pour les réserves en vue de l'hiver.



<https://www.2imangement.ch/en/other/links/wwwapisavoirch/nuclei-dete-avec-les-abeilles-des-hausses>



Claude Pfefferlé 5

Août 2018

préparation au 2^e traitement d'été



1.1. Concept de lutte contre le varroa

Mois	Actions	Objectifs
Janvier	21 jours après le traitement hivernal, la chute naturelle de varroa doit s'élever au maximum à 10 individus par jour.	Diagnostic varroa
Février		
Mars	Insérer le cadre à mâles, suivi de plusieurs découps de couvain mâles opérés.	Désover du couvain de mâles
Avril	Formation de jeunes colonies.	Formation de jeunes colonies
Mai	Mesurer la chute naturelle de varroa. Traitement d'urgence à condition lorsque plus de 3 varroas par jour sont comptabilisés.	Diagnostic varroa Traitement d'urgence
Juin	Mesurer la chute naturelle de varroa. Traitement d'urgence à condition lorsque plus de 10 varroas par jour sont comptabilisés.	Diagnostic varroa Traitement d'urgence
Juillet	1 ^{er} traitement estival à l'acide formique par juillet.	Traitement estival
Août		
Septembre	2 ^{ème} traitement estival à l'acide formique, septembre.	Traitement estival
Octobre	Évaluer mesurer la chute naturelle de varroa.	Diagnostic varroa
Novembre	Si plus de 5 individus par jour, envisager un traitement supplémentaire à l'acide formique.	
Décembre	Traitement hivernal à l'acide oxalique en absence de couvain.	Traitement hivernal

Acide formique

2^e traitement d'été, au début septembre et après un nourrissement copieux.

Enlever l'infestation varroa Endiguer la prolifération varroa Traiter

www.apiservice.ch/varsaf Hotline 0800 274 274

V.1804



Claude Pfefferlé 6

Août 2018

Diffuseurs d'acide formique



Claude Pfefferlé

Août 2018

L'inspecteur cantonal nous signale :



Si utilisation des bandes MAQS très concentrées :

Ne pas fermer les tiroirs

Bastien Nobs

Août 2018

www.apisavoir.ch

Toutes les méthodes de traitements sont expliquées sur www.apisavoir.ch



Août 2018

Take home message

Nourrissement régulier → (fin septembre)

Réserves : environ 4 cadres de miel

Elevage des nuclei créés après la récolte

Préparation 2^e traitement (début septembre)



Août 2018

Attention en septembre prochain

Après le 2^e traitement par l'acide formique :

- Bien contrôler l'éventuel remérage...
- Bien contrôler la poursuite de la ponte...



Claude Pfefferlé 11

Août 2018

Prochaine rencontre
mercredi 18.09.2018 à 19h00



Claude Pfefferlé 12



Merci pour
votre attention



www.apiSion.ch
www.abeille.ch
www.miel.ch